



INFORMACIÓN ÚTIL PARA PACIENTES

— INDICACIONES PREOPERATORIAS Y POSOPERATORIAS



Unidad de Oncología Cutánea
Cirugía de Mohs - Argentina



INDICACIONES PREOPERATORIAS

- No es necesario estar en ayunas
- No tomar aspirina la semana anterior
- Informar al médico alergias y otros medicamentos
- Tener la vacuna antitetánica al día
- Tomar 2 gr de cefalexina 2 hs antes de la cirugía
- El día de la cirugía se sugiere venir acompañado y presentarse media hora antes del horario acordado



INDICACIONES POSOPERATORIAS

Cierre con injerto

- No tocar la curación hasta el control
- Tomar cefalexina 1 g cada 12 horas
- Si hay dolor, tomar 1 comprimido de flurbiprofeno 100 mg/12 horas



INDICACIONES POSOPERATORIAS

BIOPSIA DE PIEL

Curaciones Planas

- Retirar la gasa
- Limpiar con alcohol 2 veces/día
- Cubrir con gasa y cinta



INDICACIONES POSOPERATORIAS

CIERRE CON PUNTOS

- Retirar la gasa
- Limpiar con agua oxigenada 10%
- Colocar mupirocina 2% ungüento
- Cubrir con gasa y cinta



INDICACIONES POSOPERATORIAS

USO DE LÁMINA DE SILICONA

- Recortar un fragmento del tamaño de la
- cicatriz
- Usar 12 horas al día
- Lavar cada 3 días
- Recambiar cada 10-15 días

más información
uocweb.com